

Điều trị ung thư Đại trực tràng Bằng phẫu thuật

Phẫu thuật là cách điều trị chính cho bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng. Có nhiều kỹ thuật phẫu thuật thích hợp cho mỗi bệnh nhân ở từng giai đoạn khác nhau. Bác sĩ Goh Hak Su, bác sĩ phẫu thuật ngoại tổng quát và đại trực tràng từ bệnh viện Gleneagle sẽ nói về phẫu thuật ung thư đại trực tràng di căn khi nào là làm hiệu quả.

Ngày nay phẫu thuật an toàn hơn nhiều

Mặc dù đa số bệnh nhân là người già và có vấn đề về y khoa, nhưng tỉ lệ tử vong của phẫu thuật đại trực tràng tương đối thấp. Bởi vì sự chuyên nghiệp và kỹ năng của đội ngũ chuyên gia đa chuyên khoa, sự chăm sóc của ICU, và kháng sinh và cho ăn qua đường tĩnh mạch. Dựa vào phẫu thuật hợp lý và gốc ung thư, ngày nay phẫu thuật đã chính xác và triệt để hơn. Cắt bỏ đại tràng và trực tràng hạn chế tối đa xuất huyết, chấn thương, gây vỡ thanh chẩn tự nhiên ngăn chặn sự di căn của tế bào ung thư.

Ở Singapore, phương thức stapler là dùng được và quan trọng để chắc rằng cắt đoạn cuối của ruột được nối hoàn tất để giảm nguy cơ rò rỉ ngay cả ở những khu vực khó như vùng rất thấp của vùng chậu. Một lỗ được mở trên thành bụng của cơ thể. Bác sĩ Goh nói rằng hầu hết bệnh nhân phẫu thuật đại trực tràng đều không cần thiết phải mở lỗ bởi vì kỹ thuật phẫu thuật mới hơn cho phép bảo tồn cơ vòng hậu môn (vòng cơ tại chỗ mở của hậu môn, sẽ giữ cho hậu môn đóng lại khi phân tập trung ở trực tràng. Bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt bỏ toàn bộ tế bào ung thư và nối phần ruột còn lại tới trực tràng hay hậu môn (tùy thuộc vào vị trí của ung thư) để mà bạn có thể tiếp tục loại bỏ chất thải rắn.

Phẫu thuật nội soi

Mở nội soi là kỹ thuật được phổ biến nhanh chóng và lệ thuộc cao vào kỹ năng của bác sĩ phẫu thuật. Sự phát triển của nội soi đã mở ra phương pháp cho phẫu thuật:

- Ít căng thẳng cho cơ thể
- Chức năng ruột phục hồi nhanh hơn
- Thời gian phục hồi nhanh hơn và ở bệnh viện ít hơn
- Ít đau sau phẫu thuật
- Trở lại hoạt động bình thường nhanh hơn
- Sẹo nhỏ hơn

Suốt cuộc phẫu thuật, dụng cụ nội soi (1 kính viễn vọng nhỏ có gắn camera) được đưa vào trong chỗ mở cho phép bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy bên trong bụng. 4 đến 5 vết rạch (mỗi vết từ 1 cm đến 2cm) được làm. Dụng cụ được đưa vào lỗ mở, tùy thuộc vào tình trạng bệnh, thường thì 2 phần kết thúc của ruột được nối lại với nhau bằng một vết khâu hay cái bấm sau khi đã cắt bỏ phần ruột bị bệnh. Trung bình, một ca phẫu thuật mất khoảng 2h đến 3h. Phẫu thuật nội soi nhanh hơn phẫu thuật hở. Không có vết mổ dài và ít bị căng thẳng hơn

Phục hồi

Hầu hết bệnh nhân ở lại bệnh viện khoảng 4 đến 6 ngày sau phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng. Bệnh nhân được tiêm chất dịch dưới da trong một vài ngày. Sau phẫu thuật nội soi, bệnh nhân có thể ăn hoặc uống sớm hơn nhiều so với phẫu thuật hở. Thuốc giảm đau sẽ được uống cũng như truyền dưới da qua cái pump.

Giai đoạn phục hồi cho ung thư đại trực tràng có thể kéo dài một tháng. Trong suốt thời gian đó bạn không nên nâng vật nặng. Làm việc có thể dẫn đến thoát vị hay rách cơ bụng. Bạn nên xin lời khuyên từ bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng làm thế nào để bắt đầu tập thể dục để làm khỏe lại cơ bắp vùng chậu bụng

Tại ParkwayHealth, chúng tôi có đội ngũ bác sĩ đa chuyên khoa (bao gồm bác sĩ phẫu thuật ngoại tổng quát và đại trực tràng, bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ ung thư và bác sĩ xạ trị) để cung cấp việc điều trị phẫu thuật và kiểm soát việc rối loạn lành tính và ác tính của đại tràng, trực tràng, hậu môn và vùng chậu.

Dịch vụ đại trực tràng của chúng tôi bao gồm:

- Tâm soát ung thư
- Phẫu thuật bệnh hậu môn lành tính và kiểm soát bệnh
- Điều trị bệnh trĩ/ cắt bỏ trĩ bằng stapler/ Transanal Haemorrhoidal Dearterialisation (THD)
- Điều trị nội soi và kiểm soát ruột lớn, ruột nhỏ
- Ung thư đại tràng và trực tràng
 - Phẫu thuật ung thư phức tạp hay tái phát
 - Mở nội soi một vết rạch (SILS)
 - Mở nội soi ít xâm lấn
 - Robotic Surgery for Low Anterior Resetion
 - Liệu pháp hóa trị và xạ trị
- Điều trị và kiểm soát bệnh đại tiện không kiểm soát
 - Phẫu thuật bảo tồn cơ vòng



Ung thư đại trực tràng là ung thư ở đại tràng hay trực tràng. Ở Singapore, nó là ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và nam giới. Phát hiện sớm thường được điều trị khỏi. Điều trị cho ung thư đại trực tràng bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hay kết hợp

Phẫu thuật ung thư đại trực tràng

Điều trị ung thư đại trực tràng là đặc thù hóa cho mỗi trường hợp riêng biệt. Nó dựa trên loại của ung thư, vị trí, giai đoạn di căn của bệnh hay những nhân tố khác. Ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm (giai đoạn I và II) được điều trị chỉ bằng phẫu thuật và thường được chữa khỏi. Bên cạnh phẫu thuật, ung thư tại chỗ (giai đoạn III) hay ung thư lan đến hạch bạch huyết đòi hỏi phải được hóa trị cho ung thư đại tràng và hóa trị và xạ trị cho ung thư trực tràng. Ung thư di căn (giai đoạn IV) hay ung thư đã lan đến bộ phận khác thì thường không thể điều trị nhưng phẫu thuật can thiệp là chính để làm giảm triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Theo bác sĩ Goh Hak Su, tỉ lệ sống 5 năm cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng ở Singapore đã cải thiện từ 19.5% ở năm 1973 tới 1977 đến 46.9% ở năm 1998 tới 2002. Sự cải thiện này nằm nhiều ở ung thư giai đoạn sớm, từ 32.1% tới 82.6% trong cùng một giai đoạn. Sự phát triển tuyệt vời về thuốc và kỹ năng phẫu thuật hơn 25 năm qua đã cải thiện sự kiểm soát ung thư đại trực tràng, và chúng ta đang mong chờ phần trăm tỉ lệ sống cao hơn nhiều của việc điều trị căn bệnh này.

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký cuộc hẹn, Vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân ParkwayHealth
Hỗ trợ 24/24h: HCM (08) 3823 0092 - HÀ NỘI (04) 3747 2729

Medical Help Round The Clock

Our ParkwayHealth Patient Assistance Centre (PPAC) provides a seamless and one-stop 24-hour service to our patients, connecting them to a comprehensive choice of medical services and doctors across ParkwayHealth's hospitals.
ParkwayHealth Patient Assistance Centre: 24-hour Helpline: 6735 5000 • Fax: 6732 6733 • Email: ppac@parkway.sg • Website: www.parkway.com.vn

Gleneagles Hospital • Mount Elizabeth Hospital • Parkway East Hospital